























ریاست عمومی انسنتیوت تحقیقات زراعتی
ریاست تحقیقات توافقی و تطبیقی

جدول سفارشات اگرانومیکی انواع سبزیجات مختلف در زون های اقلیمی افغانستان.

شماره	اسم سبزی	نام علمی	تصویر سبزیجات	انواع معرفی شده	ولایات		وقت بذر		مقدار تخمیری زدقی هکتار	طریق بذر	فاصله به سانتی متر		تعداد نیاات در فی هکتار	نمود بعداد بذر ربه روز	پخته شدن به هفته	تعداد آبیاری		نوع گرده افشانی	PH خاک	مقدار کودهای کیمیای در فی هکتار				وقت استعمال کودها			مدت فصل نمویی به هفته	
					گرم سیر	معتدله	گرم سیر	معتدله			سرد سیر	گرم سیر				دی ای پی	پوتاشیم سلفیت			کود عضوی به تن	یوریا	دی ای پی	پوتاشیم سلفیت	کود عضوی	یوریا	عمق بذر تخم در خاک به سانتی متر		حاصل /تن/ هکتار
۱	باندجان رومی	Lycopersicon esculentum		پیرسن، روم، هنیزکا، بل 64	گرم سیر	معتدله	اکتبر	۲۰ تا ۳۰	۲ کیلو	پلوان	بین دو نیاات	۵۰	۱۲۰	۶-۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	خودی	۵/۵-۶/۸	۱۶۰	۸۰	۱۲۰	۲۰	تماماً قبل از بذر	تماماً قبل از بذر	۲-۱	۳۳	۱۰-۸
۲	باندجان سیاه	Solanum melongena		محلی لانگ پریل، بلک بیوتی	گرم سیر	معتدله	اکتبر	۲۰-۱۵	۲ کیلو	پلوان	بین دو نیاات	۴۰	۷۵	۹-۱۵	۸	۱۰	۱۰	کراس	۵/۵-۶/۸	۱۶۰	۸۰	۱۲۰	۲۵	تماماً در وقت شانندن نهالی	تماماً در وقت شانندن نهالی	۱/۵	۱۸	۱۶
۳	بادرنگ	Cucumis sativus		انواع محلی	گرم سیر	معتدله	اکتبر	۳۰ تا ۳۵	۲ کیلو	پشته	بین دو نیاات	۵۰	۱۵۰	۱۲-۲۰	۸	۱۰	۱۰	کراس	۵/۵-۶/۸	۱۲۰	۸۰	۸۰	۲۵	تماماً در وقت شانندن نهالی	تماماً در وقت شانندن نهالی	۳	۲۷	۲۰
۴	براکلی	Brassica oleraceae		استالین گرین، سپروتنگ	گرم سیر	معتدله	اکتبر	۲۰ تا ۲۵	۲ کیلو	پلوان	بین دو نیاات	۴۰	۷۵	۶-۱۰	۱۶	۱۰	۱۰	کراس	۶-۶/۸	۱۰۰	۸۰	۶۰	۲۰	تماماً در وقت شانندن نهالی	تماماً در وقت شانندن نهالی	۱	۹	۲۰
۵	بروسل اسپروت	Brassica oleraceae		امپروفلانگ ایسلند	گرم سیر	معتدله	اکتبر	۳۰-۱۰	۱ کیلو	جویه و پشته	بین دو نیاات	۵۰	۷۰	۶-۱۰	۱۶	۱۴	۱۲	کراس	۶-۶/۸	۱۰۰	۸۰	۶۰	۲۰	تماماً در وقت شانندن نهالی	تماماً در وقت شانندن نهالی	:	۱۰-۵	۲۰
۶	بامیه	Hibiscus esculentus		محلی لوزیا ناسپنلس	گرم سیر	معتدله	اکتبر	۳۰-۱۵	۱۵ کیلو	جویه و پشته	بین دو نیاات	۳۰	۴۰	۶-۸	۱۴	۱۳	۱۰	خودی	۶-۶/۸	۱۲۰	۸۰	۸۰	۲۵	تماماً در وقت شانندن نهالی	تماماً در وقت شانندن نهالی	۴	۱۱	۱۴
۷	پیاز	Allium cepa		زرد اسپانوی، سفیده سیانوی، تکراس گرانو، پیاز محلی	گرم سیر	معتدله	اکتبر	۳۰-۱۵	۵ کیلو	خطی و نهالی	بین دو نیاات	۵	۲۰	۸-۱۵	۲۰	۱۵	۱۴	کراس	۶-۶/۸	۱۲۰	۸۰	۸۰	۲۵	تماماً در وقت شانندن نهالی	تماماً در وقت شانندن نهالی	۱/۵	۴۰	۲۸
۸	پالک	Spinacia oleraceae		اتادور بولوس دیلانگ	گرم سیر	معتدله	اکتبر	۳۰-۱۵	۱۳ کیلو	خطی	بین دو نیاات	۱۰	۲۰	۶-۱۲	۸	:	:	کراس	۶-۶/۸	۱۲۰	۶۰	۶۰	۲۵	تماماً در وقت شانندن نهالی	تماماً در وقت شانندن نهالی	۱	۵۵	۹-۸
۹	تربوز	Citrullus lanatus		چارلستن گرین، بلک دایمن گانگ، انواع محلی	گرم سیر	معتدله	اکتبر	۳۰-۱۵	۳ کیلو	جویه و پشته خطی	بین دو نیاات	۱۰۰	۱۵۰	۱۰-۱۵	۱۴	۱۰	۸	کراس	۵-۶/۸	۱۳۰	۸۰	۱۲۰	۲۵	تماماً در وقت شانندن نهالی	تماماً قبل از بذر	۳	۱۴	۱۳
۱۰	زردک	Daucus carota		لانگ اپراتور ایچینتی ننس	گرم سیر	معتدله	اکتبر	۳۰-۱۵	۳ کیلو	جویه و پشته خطی	بین دو نیاات	۳۰	۸۳۳۳۳	۱۰-۱۲	۱۰-۱۲	۱۰-۱۱	۸	کراس	۵/۵-۶/۸	۱۰۰	۸۰	۶۰	۲۵	تماماً در وقت شانندن نهالی	تماماً قبل از بذر	۱/۵	۳۸	۱۶
۱۱	خربوزه	Cucumis melo		انواع محلی عسقلانی غازی خانی، اله پوچایی قندک ارکائی زرمینن	گرم سیر	معتدله	اکتبر	۳۰-۱۵	۳ کیلو	جویه و پشته	بین دو نیاات	۱۰۰	۱۵۰	۸-۱۰	۸-۱۰	۱۰	۸	کراس	۶-۶/۸	۱۲۰	۸۰	۱۲۰	۲۵	تماماً در وقت شانندن نهالی	تماماً قبل از بذر	۳	۱۵	۱۲
۱۲	کاهو	Lactuca sativa		گریت لیک و محلی	گرم سیر	معتدله	اکتبر	۳۰-۱۵	۲ کیلو	خطی	بین دو نیاات	۱۵	۲۵	۶-۱۲	۸	۱۰	۱۰	کراس	۶-۶/۸	۱۳۰	۶۰	۶۰	۲۵	تماماً در وقت شانندن نهالی	تماماً در وقت شانندن نهالی	۱/۵	۲۳	۱۴

۱۳	۹	۲	۲۵ تن در وقت بذر	تمامادروقت ت بذر	تمامادروقت بذر	نصف نایتروجن دروقت بذرونصف دیگران وقتیکه قدنیات به ۱۰	۲۵	۸۰	۸۰	۱۲۰	۵-۶/۸	خودی	۱۰	۸	۱۶	۲	۶۰۰۰	۲۵	۱۰	خطی	۸۰۰ کیلوپیا ز	عقرب	قوس	بامیان، پروان ، کندز، بغلان و بلخ	ننگرهار، قنده ار، هلمند	محلی		Allium sativum	سیر	۱۳
۱۶	۱۴	۱/۵	قبل از شانندن نهالی	تمامادروقت ت بذر	تمامادروقت بذر	قسمت اول بعد از انتقال نهالی وقسمت دوم دروقت گل نمودن	۲۵	۶۰	۸۰	۱۰۰	۵/۵-۶/۸	کراس	۱۰	در هفته یکبار	۱۵	۱۵-۲۰	۶۶۶۶۶	۶۰	۳۰	جویه و پشته	۲ کیلوپیشکل نهالی	حمل	دلو	کابل، لغمان، ه رات، کندز	ننگرهار، قنده ار، هلمند، لغمان	هنگری و اکس کالیفورنیا و اندر		Capsicum anuum	مرچ	۱۴
۸	۱۰	۱/۵	تماماً قبل از بذر	تمامادروقت ت بذر	تمامادروقت بذر	نصف نایتروجن دروقت بذرونصف دیگران وقتیکه قدنیات به ۱۰	۲۵	۶۰	۶۰	۱۲۰	۶-۶/۸	خودی	۸	۱۲	۱۰-۱۲	۱۰-۲۰	۴۷۶۱۹	۶۰	۳۵	جویه و پشته	نهالی	حمل	اسد	بامیان، کابل، میدان وردگ، هرات	ننگرهار، قنده ار، لغمان	نوع ایرانی		Brassica oleracea	کلورابی	۱۵
۷	۱۰	۲	تماماً قبل از بذر	تمامادروقت ت بذر	تمامادروقت بذر	نصف آن در وقت بذرونصف دیگران که به گل نزدیک میشود	۲۵	۶۰	۸۰	۱۰۰	۵-۶/۸	کراس	۴-۵	۶	۸-۱۰	۴-۷	۳۳۳۳۳۳	۳۰	۱۰	جویه و پشته	۵ کیلو	سنبله	اسد	کابل، هرات، میدان وردگ، بغلان، بلخ، ک نندز	ننگرهار، قنده ار، لغمان	پرپل تاب و محلی		Brassica repa	شلغم	۱۶
۲	دسته ۲۰۰۰	۱	تماماً قبل از بذر	تمامادروقت ت بذر	تمامادروقت بذر	دروقت بذر	۲۵	۶۰	۶۰	۸۰	۵/۵-۶/۸	کراس	دو هفته	هر ۵ روز بعد	۲-۵	۴-۵	۱۳۳۳۳۳۳	۱۵	۵	خطی	۵ کیلو	بعد از هر ۲ یوم	بعد از هر ۱۵ یوم	کابل، هرات، میدان وردگ، بغلان ، بلخ، کندز	ننگرهار، قنده ار، لغمان	کومیت کریمسن		Raphanus sativus	ملی سرخک	۱۷
۱۶-۲۰	۳۲-۲۷	۱۰-۶	تماماً قبل از بذر	تمامادروقت ت بذر	تمامادروقت بذر	نصف نایتروجن دروقت بذرونصف دیگران بعد از ۴۰ روز	۲۵	۲۰	۸۰	۱۶۰	۵-۶/۸	کراس	۱۲	۱۴	۱۶-۲۰	۶-۱۰	۶۶۶۶۶	۶۰	۲۵	جویه و پشته	۱۵۰۰ کیلو	ثور	حمل	لوگر، بامیان، کابل، بغلان، کندز	ننگرهار، قنده ار، لغمان	چندر مکی، کفری لوگر		Solanum tuberosum	کچالو	۱۸
۱۶-۷	۲۴	۱	در مناطق گرم سیر ۱۰ تن	تمامادروقت ت بذر	تمامادروقت بذر	نصف نایتروجن دروقت بذرونصف دیگران قبل از گل	۲۵	۶۰	۶۰	۱۲۰	۶-۶/۸	کراس	۱۰	۱۴	۱۶	۱۰-۲۱	۲۸۵۷۱	۷۰	۵۰	جویه و پشته	نهالی	حمل	اسد	ننگرهار، قنده ار، لغمان	ارلی سنوبال و لیت سنوبال		Brassica oleracea	گلپی	۱۹	
۱۶-۲۰	۲۶	۱	در مناطق گرم سیر ۱۰ تن	تمامادروقت ت بذر	تمامادروقت بذر	نصف نایتروجن دروقت بذرونصف دیگران قبل از گل	۲۰	۶۰	۶۰	۱۲۰	۶-۶/۸	کراس	۱۰	۱۴	۱۶	۱۰-۲۱	۳۵۷۱۴	۷	۴۰	جویه و پشته	نهالی	حمل	اسد	بامیان، کابل، م یدان وردگ	ننگرهار، قنده ار، لغمان	کوبین هاگین مارکیت		Brassica oleracea	کرم	۲۰
۸-۹	۱۰	۳	قبل از بذر	تمامادروقت ت بذر	تمامادروقت بذر	نصف نایتروجن دروقت بذرونصف دیگران قبل از شروع گل	۱۵	۱۵۰	۹۰	۱۳۰	۶/۷	کراس	۱۲	۱۵	۷-۹	۵-۱۰	۶۶۶۶	۱۵۰	۱۰۰	جویه و پشته	۳ کیلو	حمل	حوت	کابل، میدان وردگ، هرات، کندز، بلخ، تخار، بغلان	ننگرهار، قنده ار، لغمان	زوجینی و انواع محلی		Cucurbita maschata	کدو	۲۱
۱۳	:	۱	قبل از بذر	تمامادروقت ت بذر	تمامادروقت بذر	تمامادروقت بذر	۲۰	۱۰۰	۸۰	۶۰	۶-۶/۸	کراس	۱۳	در هفته یکبار	۱۰-۱۲	۱۰-۱۵	۲۰۰۰۰۰	۱۰ تا ۷	۵	جویه و پشته	۵ کیلو	حمل	عقرب	در تمام ساحات معتدل	در تمام ساحات گرمسیر	انواع محلی		Allium perrum	گندنه	۲۲